

Odhalte rakovinu plic dříve, než se projeví a nenechte minulost ovlivnit vaši budoucnost

Rakovina plic je v České republice jedna z nejčastějších onkologických diagnóz a nejčastější příčina úmrtí mezi onkologickými diagnózami.

Kouření je hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic.



Até kouříte nebo jste přestali, pravidelný screening může být cestou k vašemu plicnímu zdraví. Informujte se o **možnostech screeningu rakoviny plic u svého praktického lékaře nebo plicního lékaře.**

Časně odhalení rakoviny plic je klíčové

Kritéria screeningu rakoviny plic

- Věk: 55–74 let
- Kuřáci a ex-kuřáci
- 20 a více balíčkoroků*

Lidé, kteří splňují výše uvedená kritéria, by měli zvážit svou účast v screeningovém programu. **Zejména pokud prošli onkologickou léčbou, podstoupili orgánovou transplantaci nebo trpí chronickým plicním onemocněním** (jako je CHOPN, plicní fibróza nebo chronická bronchitida). U těchto jedinců je **riziko vzniku rakoviny plic výrazně vyšší.**

Program časného záchytu rakoviny plic přispívá k zavedení screeningu rakoviny plic v České republice. Díky mezinárodnímu projektu SOLACE dochází k posílení screeningu rakoviny plic v Evropě.



www.prevenceproplice.cz

*Jeden balíčkorok znamená, že člověk kouřil jeden rok jednu krabičku cigaret denně (nebo 2 krabičky půl roku, nebo půl krabičky 2 roky apod.). Pro účast v tomto programu tedy minimálně 1 krabičku cigaret denně po dobu 20 let.